



มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับ..... 4594 วันที่ 27 ก.ย. 2565

เวลา..... 16:11 น.

ที่ สข ๐๑๓๓/ว ๒๒๕

ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเตือนมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดต่ออำเภอเมืองสงขลา นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๔.๖๒ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย ๑๗ ราย เพศหญิง ๘ ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ ๒.๑๓ : ๑ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๑ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๕ - ๙ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๖, ๓, ๒ ราย ตามลำดับ อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๔ ราย รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง, อาชีพทหาร/ตำรวจ จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๕, ๒, ๑ ตามลำดับ และพบว่าเดือนสิงหาคมมีจำนวนผู้ป่วย ๑๔ ราย ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (จำนวน ๑๐ ราย) ที่บอกถึงมีการระบาด

ในการนี้อำเภอเมืองสงขลา ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ ยุงลาย และโรคไวรัสซิกา ซึ่งทั้ง ๓ โรค มียุงลายเป็นตัวนำโรค ดังนี้

๑.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในชุมชน สถานที่สาธารณะ ทุกรูปแบบ เพื่อให้เป็นสถานที่ปลอดยุงลาย โดยดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๒.สนับสนุนการควบคุมโรคเมื่อพบผู้ป่วยทันที เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งแพร่โรคและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคไปยังพื้นที่อื่น ตามมาตรการ ๓-๓-๑ และดำเนินการต่อเนื่อง ๒๘ วัน

๓.ปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ได้แก่ ภาวะอ้วน มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น รวมทั้งการไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลล่าช้า

๔.สื่อสารประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในความรับผิดชอบ หากมีไข้เกิน ๒ วัน ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล แนะนำให้รับประทานยาพาราเซตามอล เพื่อลดไข้ และให้หลีกเลี่ยงยาประเภท NSAIDs เช่น ไอบลูโพรเฟน แอสไพริน ไดโครฟีแนค เป็นต้นจากคลินิกหรือร้านขายยา

๕.วิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย คือ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดจำนวนยุงตัวเต็มวัยและแหล่งเพาะพันธุ์ให้ได้ตามเป้าหมายอยู่ที่การไม่มีลูกน้ำยุงลายในทุกภาชนะที่มีน้ำขัง โดยการเร่งรัดในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาล วัด มัสยิด แหล่งท่องเที่ยวและโรงงาน ได้แก่ ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทุก ๗ วัน และให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้อง เรื่องวงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อและวิธีป้องกัน

๒./ทางกายภาพ...

๕.๑ ทางกายภาพ ได้แก่ การปิดภาชนะกักเก็บน้ำด้วยฝาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้าไปวางไข่ อาจจะใช้ผ้ามุง ผ้ายางหรือพลาสติกปิดและมัดไว้ ภาชนะที่ยังไม่ใช้ประโยชน์ควรจะคว่ำ มิให้รองรับน้ำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สิ่งของเหลือใช้ เช่น กระดาษ กระป๋องควรรเผาหรือฝัง แก้วพลาสติก ขยะรถยนต์ ที่รองรับน้ำฝนได้ แจกกันตอกไม้สวดควรเปลี่ยนน้ำทุก ๗ วันหรือใส่ทรายธรรมชาติเป็นที่ขับน้ำ วิธีการนี้ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดทั้งปี

๕.๒ ทางชีวภาพ คือ การปล่อยปลากินลูกน้ำลงในภาชนะเก็บกักน้ำ เช่น โอ่งตุ่ม ๒-๔ ตัว หมั่นดูแลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง วิธีนี้ง่ายประหยัดและปลอดภัย

๕.๓ ทางเคมี โดยใส่ทรายที่มีฟอสในภาชนะเก็บน้ำใช้ ควรใช้เฉพาะภาชนะที่ไม่สามารถปิดหรือใส่ปลากินลูกน้ำได้

๖. วิธีการลดยุงตัวเต็มวัย มีดังนี้

๖.๑ ใช้ไม้ตักยุง ใช้น้ำผสมน้ำสบู่หรือผงซักฟอก ฉีดพ่นให้ถูกตัวยุง

๖.๒ การพ่นเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย เป็นวิธีควบคุมยุงที่ได้ผลดี แต่ให้ผลระยะสั้น ราคาแพง ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ เพราะเคมีภัณฑ์ อาจเป็นพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยง จึงควรใช้เฉพาะเมื่อจำเป็น

๗. การป้องกันยุงกัด โดยนอนในมุ้ง ทายากันยุง ใช้สมุนไพร/พืชมลไยุง ใส่เสื้อให้มิดชิด หลีกเลี่ยงที่มีด ทีบ อับชื้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชยพร นิยมแก้ว)
นายกอำเภอเมืองสงขลา